

Vaistai, kurių nereikėtų vartoti sergant Parkinsono liga

Vaistas	Veiklioji medžiaga	Vaisto pavadinimas*	Pastabos	Sąveika
senos kartos antipsichotiniai (elgesio sutrikimams gydyti)	Fluphenazine	Moditen		blokuoja smegenyse dopamino receptorius, pablogina Parkinsono ligos simptomus
	Haloperidol	Haloperidol		
	Risperidonum	Rispolept Aleptolan Medorisper Risperidon		
	Paliperidonum palmitatum			
antiemetikai (nuo jūrligės, pykinimo, vėmimo), virškinimo sistemą ir metabolizmą veikiantys vaistai	Metoclopramide	Elitan Cerucal Metoclopramid	šiuos vaistus vartoti galima ne ilgiau 2 savaičių	
kraujospūdžiui mažinti	Methyldopa	Dopegyt		

* Registruoti Lietuvoje

Vaistai, kurių nereikėtų vartoti su Rasagiline (Azilect®)

Vaistas	Veiklioji medžiaga	Vaisto pavadinimas*	Pastabos
analgetikas	Tramadolum	Tramadol Tramadolis Tramadolor Mabron	šiuos vaistus vartoti galima ne ilgiau 2 savaičių
	Methadonum	Metadon	
antidepresantai	Mirtazapinum	Mirtazapin Mirtazapine Mirtastad Mirzaten Esprital	
dekongestantai / apetitą slopinantys / vaistai nuo peršalimo, kosulio, slogos, alergijos	Dextromethorphan	Gripex Daleron Cold 3	šiuos vaistus vartoti galima ne ilgiau 5-7 dienų
	Pseudophedrin	Gripex Daleron Cold 3 Actifed Cirrus Theraflu Clarinase	šiuos vaistus vartoti galima ne ilgiau 5-7 dienų
	Phenylephrinum	Gripex Vibrociil Coldrex Coldistan Hexarine	šiuos vaistus vartoti galima ne ilgiau 5-7 dienų
	Ephedrinum	Coldargan	šiuos vaistus vartoti galima ne ilgiau 5-7 dienų

* Registruoti Lietuvoje